

Informovaný souhlas pacienta s podáním druhé posilující dávky očkovací látky COMIRNATY

Pacient

jméno a příjmení
bydliště
rodné číslo zdravotní pojišťovna

	Zákonný zástupce	Svědék
jméno a příjmení
bydliště
rodné číslo
vztah k pacientovi

I. Informace o navrhovaném výkonu

Již jste podstoupil(a) základní očkování proti nemoci COVID-19 (dále jen „očkovací látka“) a byla Vám podána první posilující dávka.

Základní série očkování ve spojení s posilující dávkou očkovací látky nadále poskytuje určitou ochranu proti závažnému průběhu onemocnění COVID-19 způsobenému variantou omicron, ale efektivita vakcinace proti infekci a symptomatickým onemocněním je nižší a v průběhu času klesá rychleji. Poklesem ochrany jsou ve větší míře a dříve než ostatní ohroženy starší osoby a osoby s poruchou imunity nebo chronickým onemocněním (typické i pro jiná očkování).

Z výše uvedeného Vám navrhujeme podat druhou posilující dávku očkovací látky. Posilující dávka očkovací látky může být podána nejdříve po uplynutí 4 měsíců od podání první posilující dávky u osob, které dovršily 18 let věku.

Posilující dávka očkovací látky Vám bude podána injekčně do ramenního svalu. Po jejím podání se doporučuje pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu zpravidla po dobu třiceti minut, a to na místě, kde se provádí očkování.

II. Očekávaný přínos (prospěch) výkonu

Po podání posilující dávky vyvolá očkovací látka přirozenou výrobu protilátek a povzbudí imunitní buňky, aby Vás ochránily proti onemocnění COVID-19 a to intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování.

Podání posilující dávky očkovací látky mnohonásobně sníží pravděpodobnost případné nákazy onemocnění COVID-19 a jeho závažného průběhu.

I po podání posilující dávky očkovací látky je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

III. Rizika výkonu

Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevit jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte svého praktického lékaře. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě můžete být ohrožen(a) na životě.

Záměr podstoupit očkování proti onemocnění COVID-19 zkonzultujte se svým praktickým lékařem, pokud:

- jste měl(a) vážnou alergickou reakci na jiné očkování, léčivý přípravek nebo potraviny,
- jste měl(a) problémy po podání očkovací látky proti onemocnění COVID-19, jako je alergická reakce nebo potíže s dýcháním,
- nyní máte vážné onemocnění doprovázené vysokou horečkou; avšak mírně zvýšená teplota nebo lehká infekce horních cest dýchacích, jako je nachlazení, nebo prodělané onemocnění COVID-19 nejsou důvodem k odložení očkování,
- máte oslabený imunitní systém, např. v důsledku infekce HIV, nebo užíváte léky, které negativně ovlivňují imunitní systém,
- máte problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky, které omezují srážlivost krve,
- jste měl(a) problémy po podání očkovací látky proti onemocnění COVID-19, jako je myokarditida nebo perikarditida.

Pokud po konzultaci se svým lékařem máte pochybnosti ohledně vhodnosti očkování kvůli Vaší specifické situaci (např. vzácné onemocnění, vzácná kombinace onemocnění nebo postižení atp.) neváhejte se poradit s Vaším odborným lékařem. **O Vašich komplikacích informujte před očkováním očkovacího lékaře.**

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

U více než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout bolest nebo zduření v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.

U méně než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout otok nebo zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení.

U méně než jednoho očkování ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost.

Po očkování mRNA vakcínami proti nemoci COVID-19 dochází vzácně k myokarditidám a perikarditidám. Tyto případy probíhají v převážné většině případů mírně a jsou častější u mladších mužů a po druhých dávkách mRNA vakcíny.

V případě, že se u Vás některý z nežádoucích účinků vyskytne, informujte svého praktického lékaře.

Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato očkovací látka nemusí plně ochránit očkovaného proti nemoci.

Pokud máte jakékoli otázky k očkovací látce nebo k očkování, zeptejte se očkujícího lékaře.

IV. Alternativy výkonu

V současné době nejsou známy žádné alternativy výkonu.

V. Léčebný režim, preventivní opatření, kontrolní výkony

Vyvarovat se výraznější fyzické námaze dva dny po očkování.

VI. Odpovědi na doplňující otázky pacienta

Souhlas pacienta/zákonného zástupce

Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem byl(a) lékařem srozumitelně informován(a) o veškerých shora uvedených skutečnostech, navrhovaném výkonu, včetně upozornění na možné komplikace. Údaje a poučení mi byly lékařem sděleny a vysvětleny, porozuměl(a) jsem jim a měl(a) jsem možnost klást doplňující otázky, které mi byly zodpovězeny. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s navrhovaným výkonem.

.....
Datum

.....
podpis pacienta (zákonného zástupce)

.....
podpis svědka

Důvod, pro který nemohl pacient souhlas podepsat:

Prohlášení lékaře

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (zákonného zástupce) srozumitelným způsobem informoval o veškerých shora uvedených skutečnostech, navrhovaném výkonu, a to včetně upozornění na možné komplikace.

.....
Datum, čas

.....
jméno a příjmení lékaře

.....
podpis lékaře