

Změna metody stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c)

na úseku Klinické biochemie a imunoanalýza dochází ke **změně metody stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c)** - metoda **HPLC na analyzátoru Adams** je nahrazena **kapilární elektroforézou na analyzátoru Capillarys**.

Kapilární elektroforéza je **odbornými autoritami** (IFCC, EFLM) **uznávána jako metoda vyšší analytické kvality pro rutinní stanovení HbA1c**, zejména díky **lepší separaci hemoglobinových frakcí a spolehlivější detekci variantních hemoglobinů**, které mohou interferovat s výsledkem.

Provedené porovnání metod prokázalo **výbornou shodu a klinickou zaměnitelnost výsledků** (na vyžádání je dispozici). Stejný analyzátor je používán také na **motolském pracovišti**, čímž dochází k **harmonizaci výsledků mezi oběma pracovišti**.

Referenční meze zůstávají beze změny a změna metody **nemá klinicky významný dopad na interpretaci výsledků**

V případě dotazů kontaktujte:

Mgr. Marcela Mikešová, vedoucí OKBHI – 257 273 150

Ing. Denisa Nobilis, vedoucí analytik úseku klinické biochemie a imunoanalýzy - 257272438